

Insektizide gegen Blattläuse in Wintergetreide ab dem Zwei-Blatt-Stadium

Mittel (Beispiele)	Bienen- gefährdung ¹⁾	Aufwand	Anzahl Anwendungen
Pyrethroide, IRAC 3			
Hunter WG, Lambda WG ²⁾ , Lamdex forte ²⁾	B4	0,15 kg/ha	2
Kaiso Sorbie, Troid ²⁾	B4	0,15 kg/ha	1
Karate Zeon ²⁾	B4	0,075 l/ha	2
Mavrik Vita ²⁾ , Evure ²⁾	B4	0,2 l/ha	1
Decis forte ³⁾	B2	0,075 l/ha	2
Shock DOWN ⁴⁾	B2	0,1 l/ha	2
Sumicidin Alpha EC	B2	0,2 l/ha	2
Flonicamid, IRAC 29 (Anwendung > 12 °C)			
Teppeki, Afinto ⁵⁾	B2	0,14 kg/ha	2

¹⁾ **Mittel mit B2-Auflage nur nach dem täglichen Bienenflug bis 23:00 Uhr einsetzen!**

²⁾ **NN410:** Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen.

³⁾ Keine Anwendung auf drainierten Flächen

⁴⁾ Zulassung nur in Weizen

⁵⁾ Zulassung nur in Wintergerste