

Tab. 1: LSV Körnermais früh 2021 – Prüfsortiment Baden-Württemberg

			Agronomie/Resistenz			Ertrageigenschaften			
	Korn ⁶	Pflanzenlänge ¹	Standfestigkeit ¹	Bestockungsresistenz ¹	Resistenz Stängelfäule ¹	Tausendkornmasse ¹	Kornertrag ¹	Kornertrag relativ 2017–2021 ^{4;5}	TS-Gehalt relativ 2017–2021 ^{4;5}
Sorte (Reifezahl)									
Agro Fides (200) ²	(Ha)	l	h	h-sh	-	-	-	99,8	99,3
Amavit (210)	Zw	l-sl	m	h-sh	m-h	m-h	h-sh	104,4	99,4
Amello (220)	Zw/(Ha)	sl	m-h	h-sh	m-h	h	h	99,8	99,5
Beppo (200) neu	Zw	l-sl	h	h	h	m	h	100,4	101,8
Crosbey EU (210) neu	(Ha)/Zw	l	h-sh	h-sh	m-h	-	h	96,1	99,4
DKC 2684 (190)	Zw	l	h	m-h	h-sh	n-m	h	100,2	102,2
DKC 2788 (210)	Zw/(Ha)	l	h	h	h	m	h	101,5	100,7
DKC 2990 (220)	Zw	l-sl	h	m-h	h	h	h	104,3	99,3
ES Blackjack (220) neu	(Ha)	sl	h	h-sh	h-sh	m-h	h-sh	104,8	98,2
ES Yakari EU (210) neu	Zw	l-sl	h-sh	h	h	-	h	99,4	99,9
Kuno (200) neu	Zw	l-sl	h	h-sh	h-sh	m	h	100,2	101,1
KWS Stabil EU (200)	Zw	l-sl	m-h	h-sh	h	m	m-h	96,1	102,8
LG 30222 (220)	Zulassung zum 31.12.2020 gelöscht							97,2	99,2
LG 31219 EU (220)	(Ha)	l-sl	h	h-sh	h	h	h-sh	103,1	98,0
LG 31222 (220)	Zw/(Ha)	l-sl	h	m-h	h	m	h-sh	103,2	99,0
MAS 15.T ³ EU (220)	Zw/(Ha)	l-sl	h	m-h	h	m-h	h	98,6	98,7
MAS 11.K EU (200) neu	Zw	l-sl	h-sh	h	h	-	m-h	93,4	101,5
P 7460 (200)	Za	l	m	h-sh	m-h	n-m	h	94,8	100,9
P 8307 EU (220)	Zw/(Ha)	l	m-h	h-sh	m-h	-	h-sh	101,5	99,7
Santimo EU (210)	Zw/(Ha)	l	h	m-h	h	m	h	100,1	99,5
SY Brenton EU (200) neu	Zw	m-l	h-sh	h	m-h	-	h	96,3	100,8
SY Calo (220)	Zw	m-l	h	h	h	m	h-sh	104,6	99,0
Versuchsmittel der in BW geprüften Sorten dt/ha und TS %								132,2	73,8

¹**Quelle:** Beschreibende Sortenliste 2021, verändert; **Pflanzenlänge:** k=kurz; m=mittel; l=lang, sl=sehr lang; **Standfestigkeit, Stängelfäuleresistenz, Bestockung:** g=gering; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; **Ertrags- und Qualitätseigenschaften:** n=niedrig; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; ²**Sorte zugelassen als Silomais;** ³Beschreibung anhand DMK (Dtsch. Maiskomitee) – = keine offiziellen Angaben; ⁴**Standorte über die Anbaubereiche Süddeutschland:** insgesamt 12 LSV; Baden-Württemberg: Kupferzell, Ladenburg, Tailfingen, Boxberg und Standorte Rheinland-Pfalz, Bayern; ⁵**Hohenheim-Gülzow-Methode/Statistik:** Dr. Hartung/LTZ Augustenberg; ⁶Ha: Hartmais; (Ha): hartmaisähnlich; Zw: Zwischentyp; Za: Zahnmais; (Za): zahnmaisähnlich